

Wat is een open provocatietest?

Een open provocatietest wordt gedaan bij kinderen die verdacht worden van een allergie voor een bepaald voedingsmiddel.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de Kind- en jongerenafdeling van het Zaans Medisch Centrum.

Vorbereiding

Allergische reacties moeten zo goed als verdwenen zijn bij aanvang van de test. Ook eczeem moet goed behandeld zijn. 48 uur voor aanvang van de test moet gestopt worden met corticosteroïden. Drie dagen van tevoren moet gestopt worden met antihistaminica. Dit wordt allemaal poliklinisch met de arts afgesproken.

Als uw kind ziek is (geweest) met of zonder koorts in de week voor de test, kan de test misschien niet doorgaan. Ook bij toename van salbutamolgebruik of andere benauwdheidsklachten kan de test misschien niet doorgaan. Graag meteen melden als dit het geval is.

Dag van het onderzoek

Uw kind mag thuis normaal ontbijten: 1 of 2 broodjes of cornflakes.

Tijdens de test mag uw kind thee, verdunde limonade en water drinken, maar niets eten. Voor baby's graag wel voeding meenemen. Als uw baby ontroostbaar is, mag u een paar slokjes geven.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats tijdens een dagopname op de Kind- en jongerenafdeling. Voor aanvang van de test wordt uw kind gezien door de arts en worden er controles gedaan.

Vervolgens krijgt uw kind elke 30 minuten een grotere hoeveelheid van het voedingsmiddel toegediend. Er wordt begonnen met heel weinig wat steeds meer wordt tot uiteindelijk een "normale" portie.

Vóór elke gift wordt beoordeeld of uw kind heeft gereageerd op de vorige toediening. Uw inbreng is hierbij belangrijk.

Tijdens de test mag uw kind thee, verdunde limonade en water drinken, maar niets eten. Uw kind mag tijdens de test niet van de afdeling, maar kan (afhankelijk van de leeftijd) wel in de speelkamer spelen of op de kamer iets leuks doen.

Na de test

Na de test blijft uw kind nog 2 uur. Dit om zeker te zijn dat uw kind geen reactie vertoont. Na deze 2 uur wordt uw kind nogmaals door de arts gezien. Het onderzoek is meestal rond 15.00 uur afgelopen. Als er wel een reactie is dan moet uw kind tot 16.00 uur blijven.

Late reacties

Als er thuis na de test een acute reactie optreedt (zwellings, galbulten, ongecontroleerd braken, benauwdheid), kunt u altijd contact opnemen met de Kind- en jongerenafdeling. Het telefoonnummer staat onderaan deze folder.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts via een afspraak op de polikliniek of u wordt telefonisch op de hoogte gehouden. Met de arts wordt besproken wat het resultaat is van de test en hoe verder om te gaan met dit voedingsmiddel.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de test of wilt u contact omdat uw kind thuis nog een reactie heeft? U kunt dan contact opnemen met de Kind- en jongerenafdeling op telefoonnummer 075 650 7438.