

De kaakchirurg heeft een kroon geplaatst. In deze folder vindt u praktische informatie over de geplaatste kroon en de mogelijke bijwerkingen.

Wanneer zit de kroon vast?

De implantaten moeten 2 tot 3 maanden ingroeien.

U mag niet kauwen aan de kant waar het implantaat is geplaatst.

2 weken na de behandeling

U gaat op controle bij de kaakchirurg en zo nodig worden de hechtingen verwijderd.

U moet nog steeds zacht eten.

6 weken na de behandeling

U gaat op controle bij de kaakchirurg en er wordt eventueel een röntgenfoto gemaakt. U krijgt te horen of u afspraken met de tandarts mag maken voor het maken van de kroon.

Neem het implantaten-paspoort mee naar de tandarts.

3 maanden na de vorige afspraak

Als de kroon geplaatst is, gaat u op controle en wordt er een röntgenfoto bij de kaakchirurg.

Jaarlijks

1x mondhygiëniste

1x controle met röntgenfoto bij de kaakchirurg

1x controle bij uw eigen tandarts/tandprotheticus

Na implanteren

<i>Verdoving:</i>	is uitgewerkt na twee tot vier uur, daarna kunt u weer eten en drinken: niet te heet, niet te koud de eerste 24 uur.
<i>Pijn:</i>	het is mogelijk dat u nog enige dagen last heeft. U kunt gebruik maken van de voorgeschreven pijnstiller of paracetamol.
<i>Zwelling:</i>	het is mogelijk dat er zwelling van het gezicht optreedt. Na 3 à 4 dagen is de zwelling op z'n hoogtepunt en neemt daarna langzaam weer af. Zwelling kunt u enigszins beperken door na de behandeling de eerste uren de buitenzijde van de mond te koelen.
<i>Beperkte mondopening:</i>	door zwelling kan dit verschijnsel optreden, als de zwelling afneemt zal de mondopening weer normaal worden.
<i>Hechtingen:</i>	eventueel moeten de hechtingen verwijderd worden.
<i>Bloedverlies:</i>	licht bloedverlies de eerste dag is normaal.
<i>Koorts:</i>	de eerste 4 dagen na de ingreep kan er een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur optreden. (tot 38.5 °C)
<i>Mondhygiëne:</i>	de eerste 24 uur na de behandeling de mond niet spoelen, dit kan opnieuw bloeden veroorzaken. Na 24 uur de normale mondhygiëne weer hervatten aangevuld met het voorgeschreven spoelmiddel.

Complicaties

- Ernstige nabloeding, *die niet te stoppen is*.
- **Hoge koorts**, boven 39 °C.
- **Toenemende zwelling**, 3 à 4 dagen ná de behandeling.
- **Hevige, toenemende pijnklachten**, 3 à 4 dagen ná de behandeling.

Neem bij één of meerdere van bovenstaande complicaties contact op met de Poli Kaakchirurgie tel. 075 6501235 (bereikbaar van 08.15 u tot 17.00 u op werkdagen) of de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.