

## **Kunstgebit**

De implantaten moeten 2 tot 3 maanden ingroeien.

Er mag niet worden gekauwd met de implantaten.

Eerste 2 weken mag de prothese niet gedragen worden.

9 weken zacht eten!

### **1. Na 2 weken**

Controle en zo nodig worden de hechtingen verwijderd.

De oude prothese wordt aangepast door de tandprotheticus of kaakchirurg zodat u die tijdelijk kunt gebruiken.

Nog steeds zacht eten!

### **2. Na 6 weken**

Controle en eventueel een röntgenfoto. U krijgt te horen of u afspraken met de tandarts/tandprotheticus mag maken voor het maken van de opbouw en het nieuwe kunstgebit. Het implantaten-paspoort moet u meenemen naar de tandarts/tandprotheticus.

### **3. 3 maanden na de vorige afspraak:**

Als het nieuwe gebit klaar is; een controle met röntgenfoto bij de kaakchirurg.

### **4. Jaarlijks**

1x mondhygiëniste

1x controle met röntgenfoto bij de kaakchirurg

1x controle bij uw eigen tandarts/tandprotheticus

### **'s Nachts prothese uit!**

Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

M.R.E. Bom, kaakchirurg

E.L. van der Mark, kaakchirurg

## **Na implanteren**

<i>Verdoving:</i>	De verdoving is uitgewerkt na twee tot vier uur, daarna kunt u weer eten en drinken: niet te heet, niet te koud de eerste 24 uur.
<i>Pijn:</i>	Het is mogelijk dat u nog enige dagen last heeft. U kunt gebruik maken van de voorgeschreven pijnstiller of paracetamol.
<i>Zwelling:</i>	<p>Het is mogelijk dat er zwelling van het gezicht optreedt.</p> <p>Na 3 à 4 dagen is de zwelling op z'n hoogtepunt en neemt daarna langzaam weer af. Zwelling kunt u enigszins beperken door na de behandeling de eerste uren de buitenzijde van de mond te koelen.</p>
<i>Beperkte mondopening:</i>	Dit kan door zwelling gebeuren. Als de zwelling afneemt, zal de mondopening weer normaal worden.
<i>Hechtingen:</i>	Eventueel moeten de hechtingen verwijderd worden.
<i>Bloedverlies:</i>	Licht bloedverlies de eerste dag is normaal.
<i>Koorts:</i>	De eerste 4 dagen na de ingreep kunt u een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur hebben (tot 38.5 °C)
<i>Mondhygiëne:</i>	De eerste 24 uur na de behandeling de mond niet spoelen, dit kan opnieuw bloeden veroorzaken. Na 24 uur de normale mondhygiëne weer hervatten aangevuld met het voorgeschreven spoelmiddel.

### **Complicaties**

- Ernstige nabloeding, **die niet te stoppen is.**
- **Hoge koorts**, boven 39 °C.
- **Toenemende zwelling**, 3 à 4 dagen ná de behandeling.
- **Hevige, toenemende pijnklachten**, 3 à 4 dagen ná de behandeling.

Bij één of meerdere van bovenstaande complicaties neemt u contact op met de Poli Kaakchirurgie tel. 075 650 1235 (bereikbaar van 08.15 u tot 17.00 u op werkdagen) of buiten deze tijden met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis op nummer 075 650 2600.