

In deze folder vindt u informatie over de behandeling van hoofd- en aangezichtspijn door middel van een blokkade van het ganglion sphenopalatinus. Het ganglion sphenopalatinus is een zenuwknoop, die zich diep in de wand van de neus bevindt.

Blokkade van het ganglion sphenopalatinus

Door het ganglion sphenopalatinus lopen zenuwvezels, die te maken kunnen hebben met bepaalde vormen van aangezichts- en hoofdpijn. Bij de behandeling plaatsen we onder röntgendoorlichting een speciale naald via de wang bij het betreffende zenuwknoopje in de wand van de neus. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving en zonodig krijgt u een rustgevend middel toegediend. Eerst controleren we de naaldpositie met kleine prikkelstroompjes. U voelt dat in neus, tanden of gehemelte. Vervolgens vindt verdere verdoving plaats door injectie van een verdovingsmiddel of volgt een behandeling van het zenuwknoopje met warmte die opgewekt wordt door middel van radiofrequentie (RF) stroom. De behandeling vindt plaats in het dagbehandeling.

Let op

- U moet voor deze behandeling nuchter zijn.
- Informeer ons vóór de behandeling bij een (eventuele) zwangerschap.
- Als u bloedverdunders gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol). Soms mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. De pijnspecialist zal bespreken of de bloedverdunders tijdelijk gestaakt moeten worden en zo ja voor hoelang. Alle andere medicijnen blijft U gewoon innemen.
- Na de behandeling blijft U nog vier uur in de herstellkamer.
- Na de pijnbehandeling mag u NIET zelfstandig naar huis gaan (niet autorijden, niet op de fiets, niet met openbaar vervoer of lopend)

Houd hier rekening mee.

Bij ontslag wordt u met een rolstoel naar de hoofdingang/parkeergarage gebracht door patiëntenvervoer van het ZMC.

Complicaties

Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit; toch is er een geringe kans op complicaties. U kunt tijdelijk een doof gevoel in het gehemelte krijgen of er ontstaat een bloeditstorting in de wang. Ongeveer 3% van de patiënten krijgt een bloedneus als in de neus een bloedvaatje geraakt wordt. Soms moet de KNO arts deze bloedneus behandelen.

Bijwerking

Na de behandeling kan napijn optreden, die enkele weken kan aanhouden. U kunt hiertegen een pijnstiller innemen (bv. paracetamol volgens bijsluiter).

Resultaat

Pas na enkele weken kunt u het resultaat van de behandeling goed beoordelen. Soms is verdere behandeling noodzakelijk of is een tweede behandeling noodzakelijk.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan kunt u:

- Een mail sturen
- Een bericht via BeterDichtbij App sturen, mits u hier al voor bent aangemeld
- Telefonisch contact opnemen. Het kan handig zijn om uw vragen van te voren op papier te zetten.

Belangrijk: Indien u het antwoordapparaat te horen krijgt, luistert u dan het gehele bandje af. U krijgt dan de benodigde informatie over het telefonisch spreekuur

Contactgegevens

Pijncentrum Zaans Medisch Centrum,
Koningin Julianaplein 58,
1500 EE Zaandam
Emailadres: pijncentrum@zaansmc.nl
Tel. 075 650 79 06