

Inleiding

De testikels (zaadballen) ontwikkelen zich bij jongetjes tijdens de zwangerschap in de buik. Ongeveer een maand voor de geboorte zijn de testikels via de lies in de balzak (scrotum) ingedaald. Normaal gesproken heeft een jongetje bij de geboorte dan ook beide zaadballen in zijn balzak. Soms gebeurt de indaling niet. Eén of beide zaadballen blijven dan in de buik of de lies zitten. Op latere leeftijd kunnen hierdoor problemen met de vruchtbaarheid ontstaan. Een niet ingedaalde zaadbal heeft geen invloed op de seksuele functies. Zijn de zaadballen in het tweede levensjaar nog niet ingedaald, dan is medisch ingrijpen wenselijk.

Vorbereiding op de operatie

Na het gesprek met de uroloog bezoekt u met uw zoon het spreekuur van de poli anesthesie. De anesthesioloog onderzoekt uw zoon en bespreekt met u of uw zoon de operatie kan ondergaan. Met de anesthesioloog bespreekt u de wijze van verdoving. Wij adviseren u om voor de operatie een afspraak te maken met de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker kan uw zoon precies vertellen wat er op de dag van opname gaat gebeuren. Normaal gesproken wordt uw zoon op de dag van de operatie opgenomen.

Operatiedag

U moet met uw zoon op het aangegeven tijdstip op de kinderafdeling aanwezig zijn. De anesthesioloog heeft u verteld dat uw zoon nuchter moet zijn voor de operatie. Dit betekent dat uw zoon na een afgesproken tijd niet meer mag eten en drinken. De verpleegkundige op de afdeling heeft voor de operatie nog een kort gesprek met u over de gang van zaken. U kunt hier eventueel nog vragen stellen voordat uw zoon geholpen wordt.

Operatie

De operatie die nodig is om een zaadbal in de balzak te brengen heet orchidopexie. Het is een operatie die ongeveer 1 uur duurt.

De uroloog maakt een sneetje in de lies en een sneetje in de balzak. Via de opening in de lies wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt. Via het sneetje in de balzak wordt de zaadbal naar de balzak gebracht, waar deze wordt vastgezet. Stelt de uroloog tijdens de operatie een liesbreukje vast dan wordt dit meteen verholpen. De huidwond in de lies en de balzak worden meestal met oplosbare hechtingen gesloten. Ze hoeven dus niet verwijderd te worden. De wondjes kunnen wat gaan dragen als reactie op de hechtingen (wondvocht), dit kan geen kwaad. Zodra de hechtingen uit de wondjes zijn, verdwijnt dit.

Na de operatie

Als uw kind in dagopname is behandeld, kan hij dezelfde dag nog naar huis.

Wij raden u aan het kind per auto naar huis te vervoeren. Zorg dat er iemand achterin de auto bij het kind gaat zitten. Er is dan iemand dicht bij het kind als het extra aandacht nodig heeft.

Richtlijnen na de ingreep

- Thuis mag uw kind wat water en thee drinken. Is uw kind niet misselijk dan mag het 's avonds wat licht voedsel zoals pap, bouillon, appelmoes of puree eten. Geen koolzuurhoudende dranken.
- Zeker de eerste dag moet uw kind rustig aandoen, dus in bed blijven of op de bank gaan liggen. De dag na de operatie kunt u uw kind weer gewoon zijn gang laten gaan. Waarschijnlijk zal hij de eerste dagen wat minder actief zijn.
- De pleister kunt u het beste de eerste twee dagen laten zitten, daarna mag deze worden verwijderd. Ook mag uw kind dan weer onder de douche of even in bad. Basisregel van de wondbehandeling is schoon en droog houden. Dus na het douchen of wassen de wond droogdeppen. Eventuele luiers kunt u het beste wat vaker verwisselen.
- Als uw kind aangeeft dat hij pijn heeft, mag u een paracetamol (zetspil of tablet) geven.
- Het is beter de eerste twee weken niet te sporten, gymnastiek te doen, te zwemmen of te fietsen. Als hij fit genoeg is, kan hij na een week weer naar school.

Risico's en complicaties

Het is normaal dat de balzak na de operatie een beetje gezwollen is en er blauw-roodachtig uitziet. Er kan een nabloeding optreden, die zich meestal uit in een bloeduitstorting onder de hechting. Normaal gesproken verdwijnt deze vanzelf en is behandeling niet nodig. Soms treedt er een infectie of een abces op. In de meeste gevallen moet dit in het ziekenhuis worden behandeld.

Controle

Volgens afspraak komt u met uw zoontje ter controle bij de uroloog.

Ziekte of verhindering

De operatie van uw kind kan niet doorgaan als:

- Uw kind op de ochtend van de ingreep een temperatuur boven de 38 °C heeft
- Er in de omgeving besmettelijke ziekten voorkomen zoals mazelen, waterpokken, rode hond en bof.

Wij verzoeken u dit dan telefonisch door te geven aan het secretariaat urologie 075 650 1290 of aan het opnameburo 075 650 2214.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft of als er complicaties ontstaan na de ingreep kunt u contact opnemen met onderstaande nummers:

Polikliniek urologie (via het Klantcontactcentrum) – maandag tm vrijdag tussen 08:30-16:30 uur: 075 650 12 90

Spoedeisende Hulp – buiten bovenstaande tijden: 075 650 26 00