

U heeft vandaag een operatie aan de plasbuis ondergaan. Deze tekst geeft u informatie over de zorg na de operatie.

Pijnbestrijding

De eerste dagen na de operatie kan het operatiegebied pijnlijk zijn. De anesthesioloog heeft een recept voor pijnstilling geschreven. De verpleegkundige zal u uitleg geven over de voorgeschreven medicatie.

Complicaties

Na de operatie kan een nabloeding optreden met mogelijk bloedverlies en stolselvorming tot gevolg. Meestal stopt zo'n bloeding spontaan na het spoelen van de blaas en het verwijderen van de stolsels. Na het verwijderen van de katheter is het plassen vaak gevoelig en branderig, ook kan er een blaasontsteking ontstaan die gepaard kan gaan met koorts en behandeld moet worden met antibiotica.

Richtlijnen voor de eerste weken na de operatie

De catheter mag u na 3 dagen zelf verwijderen, of vlgs afspraak bij de uroloog.

Douchen mag, in bad of zwemmen mag na 2 weken.

De eerste 2 weken niet fietsen.

Huishoudelijk werk met mate uitbreiden.

Gedurende 2 weken geen seksuele activiteiten.

Goed drinken: 1,5 – 2 liter per dag

Controle

Na ongeveer 6 weken wordt u terugverwacht voor poliklinische controle. De afspraak krijgt u bij ontslag mee

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis

- Bij hevige pijnklachten die niet afnemen als u pijnstillers gebruikt.
- Bij hevig bloedverlies uit de plasbuis of als u grote stolsels uitplast.
- Bij koorts, een temperatuur hoger dan 38,5 °C.

Bij problemen of vragen na uw ontslag kunt u contact opnemen met het ziekenhuis:

Tot 17.00: polikliniek urologie via het klanten contact centrum
075 650 1290

Na 17.00: afdeling Spoedeisende Hulp
075 650 26 00