


Wat zijn transperineale biopten?

Samen met uw uroloog heeft u besproken dat u een prostaatbiopsie zal ondergaan. Bij een prostaatbiopsie worden stukjes weefsel uit de prostaat gehaald met een holle naald. Zo'n stukje weefsel heet een biopt. De biopsie doen we gelijktijdig met een echografie. We doen dit onderzoek om te kijken of u prostaatkanker heeft of dat het gaat om een goedaardige vergroting of een ontsteking van de prostaat. Het prostaatbiopt wordt transperineaal gedaan. Dit betekent dat er via de huid tussen de anus en de balzak (ook wel perineum genoemd) met een naald wordt geprikt. Dit is een nieuwe techniek waarmee de arts beter bij de prostaat kan komen en de kans kleiner is dat de arts kankercellen mist. Bovendien is de kans op infectie klein zodat u geen antibiotica nodig heeft.



Het onderzoek

Voor een prostaatonderzoek moet u uw onderkleding en schoenen uittrekken. Daarna gaat u op een onderzoekstafel liggen met uw benen in de beensteunen. De arts zal dan eerst via de anus naar uw prostaat voelen. Vervolgens wordt de huid tussen de balzak en de anus verdoofd met een dun naaldje. Deze prik geeft een branderig gevoel. Daarna brengt de arts een echoprobe in via de anus. Dit is niet pijnlijk maar kan een beetje onaangenaam aanvoelen. Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk ontspant. Met de echoprobe wordt de prostaat in beeld gebracht zodat we de prostaat op het beeldscherm goed kunnen bekijken. Hierdoor kunnen we precies bepalen waar de biopten genomen moeten worden. Dan wordt de prostaat verdoofd met twee prikken. De verdovingsprikken kunnen even pijnlijk zijn. De arts zal daarna met een holle naald meerdere stukjes weefsel uit de prostaat nemen. Hier zult u door de verdoving weinig last van ondervinden. Hierbij hoort u een klikkend geluid.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek kunt u meteen naar huis. De eerste 3 dagen na het onderzoek mag u niet fietsen of andere activiteiten doen waarbij u op een zadel zit. Wij raden u ook aan niet direct na het onderzoek zelf auto te rijden. Als u niet opgehaald kunt worden, kunt wel met het openbaar vervoer naar huis.
- Plassen kan tijdelijk wat moeilijker gaan.

- Een tot twee weken na het onderzoek kan er een beetje bloed in de urine te zien zijn. In het sperma kan dat wel tot drie maanden na het onderzoek te zien zijn. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken.

Wanneer moet u wel een arts raadplegen?

- Als u koorts heeft (38,5 graden celcius of hoger)
- Als u niet meer kunt plassen
- Als het vaker plassen of de pijn bij het plassen langer dan een week aanhoudt

De uitslag

Het afgenomen weefsel wordt onderzocht door de patholoog. Tijdens de vervolgspraak zal uw uroloog de uitslag met u bespreken. Dan hoort u ook of er meer onderzoek nodig is.

Heeft u nog vragen?

Polikliniek urologie (via het Klantcontactcentrum): 075 650 1290
maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 16.30 uur

Spoedeisende Hulp (buiten kantoortijden) 075 650 2600