

De cardioloog heeft in overleg met u een Flecaïnide provocatietest afgesproken en al informatie gegeven over de reden van het onderzoek.

In deze folder willen wij u uitleggen hoe het onderzoek verloopt, zodat u weet wat u kunt verwachten.

## **Wat is een Flecaïnide provocatietest?**

Uw specialist heeft in het kader van uw cardiologisch onderzoek een Flecaïnide provocatietest voor u afgesproken. Tijdens dit onderzoek wordt het effect van dit medicijn op uw hart bestudeerd via het hartfilmpje (ECG).

## **Waarom een Flecaïnide provocatietest?**

Flecaïnide (Tambocor) is een geneesmiddel tegen hartritmestoornissen. Flecaïnide vertraagt de elektrische geleiding in het hart. Hierdoor kunnen bepaalde zeldzame oorzaken van ritmestoornissen worden ontdekt, ook als deze op het 'normale' hartfilmpje niet zichtbaar zijn. Omdat Flecaïnide de geleiding in het hart beïnvloedt, wordt dit middel onder hartritmecontrole op de hartbewaking toegediend.

## **Vorbereiding**

- Op de dag van het onderzoek dient u 6 uur van tevoren nuchter te blijven. Dit houdt in dat u vanaf 6 uur voor het onderzoek niet mag eten, drinken en roken.
- Neem nachtkleding en toiletartikelen mee voor het geval u ter observatie moet blijven na het onderzoek.
- Wij raden aan iets mee te nemen waarmee u zich kunt vermaken (boek, tijdschrift, puzzelboekje) aangezien het onderzoek een aantal uur in beslag neemt. Daarnaast adviseren wij om gemakkelijke kleding aan te trekken.

## **Het onderzoek**

Wanneer u op de Hartbewaking arriveert, wordt u door de verpleging opgevangen. De verpleegkundige zal een aantal dingen met u bespreken en onder andere een contactpersoon noteren. Daarna wordt u aan een monitor aangesloten die uw hartritme registreert. Om de medicatie te kunnen toedienen voor het onderzoek, zal de verpleegkundige u een infuusnaald geven.

Voor, tijdens en na het inlopen van de medicatie, zal er geregeld een hartfilmpje gemaakt worden. Hierbij wordt ook de bloeddruk gecontroleerd.

Mocht u tijdens het inlopen van de medicatie klachten krijgen, zoals licht in het hoofd, duizeligheid of hartkloppingen, moet u direct de verpleging waarschuwen. Eventueel kan dan de toediening van de medicatie voortijdig worden gestopt. Ook kan bij veranderingen op het hartfilmpje de toediening voortijdig beëindigd worden.

Na het inlopen van de medicatie wordt het hartfilmpje een aantal keer herhaald. De laatste keer zal zijn 1 uur na het inlopen van de medicatie. Na het laatste hartfilmpje of het tussentijds stoppen van de medicatie, zal de cardioloog besluiten of u naar huis mag of opgenomen wordt ter observatie.

### **Bijwerkingen van de Flecaïnide provocatietest**

Tijdens de toediening van Flecaïnide zou u last kunnen krijgen van de volgende bijwerkingen: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken, dubbelzien, tremor en tintelingen. Als gevolg van de toediening van Flecaïnide kunnen ook hartritmestoornissen optreden. De kans hierop is groter bij bepaalde erfelijke ritmestoornissen.

### **Duur van het onderzoek**

Voor dit onderzoek trekken wij minimaal 2 uur uit. Bij verandering van het hartfilmpje of hartritmestoornissen blijft u in principe opgenomen.

### **Uitslag**

De uitslag van de Flecaïnide provocatietest wordt direct na de test met u besproken.

### **Tot slot**

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de Hartbewaking, via telefoonnummer 075 650 2239.