

U heeft vandaag een operatie aan de plasbuis ondergaan. Deze tekst geeft u informatie over de zorg na uw operatie.

Pijnbestrijding

De eerste dagen na de operatie kan het operatiegebied pijnlijk zijn. De anesthesioloog heeft een recept voor pijnstilling geschreven. De verpleegkundige zal u uitleg geven over de voorgeschreven medicatie.

Complicaties

Kort na de operatie is het plassen vaak gevoelig en branderig. Ook kan er een blaasontsteking ontstaan die gepaard kan gaan met koorts en behandeld moet worden met antibiotica.

Activiteiten

- Douchen mag, in bad of zwemmen mag na 2 weken.
- De eerste 2 weken mag u niet fietsen.
- Huishoudelijk werk met mate uitbreiden.
- Gedurende 2 weken geen seksuele activiteiten.

Controle

Na ongeveer 4 weken wordt u terugverwacht voor poliklinische controle. De afspraak krijgt u bij ontslag mee.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

- Bij hevige pijnklachten die niet afnemen als u pijnstillers gebruikt.
- Bij hevig bloedverlies uit de plasbuis of als u grote stolsels uitplast.
- Bij koorts, een temperatuur hoger dan 38,5 °C.

Bij problemen of vragen na uw ontslag kunt u contact opnemen met het ziekenhuis.

Tot 16.30 uur verzoeken wij u, bij problemen, contact op te nemen met de poli urologie via het Klantcontactcentrum op nummer 075 650 2718

Na 16.30 afdeling Spoedeisende Hulp op nummer 075 650 2600