

U heeft vandaag een infuus gehad met Infliximab (Remicade/ Remsina) .

Wat is Infliximab (Remicade /Remsima) ?

Infliximab is een TNF-blokker. Het blokkeert de werking van TNF-alpha. Dit is een stof (eiwit) die van nature in het lichaam aanwezig is. TNF-alpha speelt een belangrijke rol in het ontstekingsproces. Het zorgt ervoor dat een ontsteking op gang komt, zodat bijvoorbeeld een bacterie of virus onschadelijk wordt gemaakt. De ontsteking neemt dan weer af. Bij de ziekte van Crohn en bij Colitis Ulcerosa houdt TNF-alpha de chronische ontsteking in stand. Infliximab zorgt er dan voor dat ontstekingen in kracht verminderen en nieuwe ontstekingen worden voorkomen.

Op internet kunt u uitgebreide informatie vinden over Infliximab. Wanneer u thuis geen internet heeft, zal de verpleegkundige u aanbieden deze informatie voor u uit te printen zodat u de informatie naar behoefte kunt doorlezen.

Effect van Infliximab

Het is niet te voorspellen wanneer u precies merkt of de Infliximab werkt. Uw behandeld arts houdt u onder controle en zal dit met u bespreken.

Bijwerkingen

Zoals bij alle geneesmiddelen, kan ook het gebruik van Infliximab bijwerkingen geven maar niet iedereen ondervindt deze bijwerkingen. Bijwerkingen die kunnen optreden tijdens de toediening of vlak daarna zijn:

- Overgevoeligheidsreactie als gevolg van het infuus. Uw lichaam kan schrikken doordat het in korte tijd een kwart liter extra volume in de bloedbaan krijgt. Dit kan zich uiten door schommelingen in de bloeddruk. De verpleegkundige controleert daarom regelmatig de bloeddruk. Ook kunnen lichtheid in het hoofd en een warm gevoel optreden. Deze klachten nemen na de infusie meestal snel af.
- Overgevoeligheidsreactie als gevolg van het middel of één van de bestanddelen. De meest voorkomende verschijnselen zijn; huiduitslag of netelroos, vermoeidheid, problemen met ademen zoals benauwdheid en een piepende ademhaling of daling van de bloeddruk. Dit kan tot één uur na de infusie optreden, ook als eerdere behandelingen wel goed zijn gegaan.

Eventuele bijwerkingen worden tijdens de behandeling door de verpleegkundige behandeld en aan uw arts doorgegeven.

Er zijn ook bijwerkingen die kunnen optreden na de toediening van Infliximab. Belt u dan zo snel mogelijk naar een van onderstaande telefoonnummers:

Tot 16:30 uur: polikliniek interne geneeskunde via het Klantcontactcentrum
075 650 25 80

Na 16:30 uur: afdeling Spoedeisende Hulp
075 650 26 00

De bijwerkingen die kunnen optreden zijn:

- Gezwollen handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel, waardoor ademen of slikken bemoeilijkt wordt
- Pijn of zwakheid in borst, spieren, gewrichten of kaken
- Netelroos of andere tekenen van een allergische reactie
- Koorts
- Huiduitslag, jeuk
- Kortademigheid tijdens een inspanning of wanneer u gaat liggen
- Moeilijke ademhaling en droge hoest
- Problemen met urineren
- Hartritmestoornissen (hartkloppingen)
- Een licht gevoel in het hoofd of hoofdpijn
- Heesheid en/of hoesten
- Teken van problemen met het zenuwstelsel toevallen/ stuipen, tintelingen of gevoelloosheid in een lichaamsdeel
- Slap gevoel in armen en/of benen
- Oogproblemen, veranderingen in het zien
- Teken van lever- of miltproblemen: ogen die geel worden, huid die geel wordt, donderbruin gekleurde urine, pijn in de bovenbuik

Controle:

Wanneer u nog geen vervolgspraak heeft, krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek Interne Geneeskunde.

Zwangerschap

Als u een kinderwens heeft, overleg dan altijd eerst met uw behandelend arts over deze wens en wat het gebruik van Infliximab hierin betekent.