

In overleg met uw arts gaat u starten met een Ferinject infuus. In deze folder vindt u informatie over wat een Ferinject is, over de toediening en de eventuele bijwerkingen. Verder zullen wij u vertellen wat belangrijk is om te weten voor de opname.

## **Wat is een Ferinject?**

Ferinject is een medicijn dat wordt gebruikt bij het behandelen van bloedarmoede. Het bevat ijzer. Dit is een belangrijke stof die zorgt voor zuurstofvervoer naar onder andere de spieren en de organen.

## **Toediening van Ferinject**

- Ferinject wordt via een infuus in de ader toegediend. De vloeistof die u krijgt, is bruin van kleur.
- Deze toediening wordt gedaan op het oncologisch dagcentrum, route noord 1.1 of op de afdeling dagopname, route noord 4.1.
- Afspraken voor het toedienen van het infuus worden van maandag tot en met vrijdag ingepland op het oncologisch dagcentrum of de dagopname. Deze afspraak wordt ingepland door de poli interne of oncologie.

## **Opname**

- Houdt u rekening met een opname van 1 uur.
- Op de afdeling worden eerst controles uitgevoerd, waarna er een infuus geprikt zal worden. De toedieningstijd van het infuus zal variëren van 15 tot 30 minuten.
- Het is de bedoeling dat u na het infuus nog 30 minuten blijft in verband met de observatie.
- Het is niet nodig om nuchter te zijn.
- U moet zich voor de opname eerst aanmelden bij de ontvangstuilen in de centrale hal op de begane grond. Voor het oncologisch dagcentrum (noord 1.1) kunt u zich vervolgens aanmelden bij de verpleegkundigen op de afdeling. Voor de dagopname (noord 4.1) kunt u zich aanmelden via de aanmeldzuil op de afdeling.

## **Mogelijke bijwerkingen**

Zoals bij alle geneesmiddelen kan ook het gebruik van Ferinject bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen zijn mild en niet iedereen heeft deze bijwerkingen.

Als u last krijgt van deze bijwerkingen is het toegestaan om 3 x per dag 1000mg paracetamol te gebruiken voor maximaal 3 dagen.

Heeft u nog klachten na 3 dagen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek van uw medisch specialist.

**De meest voorkomende bijwerkingen:**

- Hoofdpijn
- Duizeligheid
- Misselijkheid, braken
- Buikpijn
- Spierpijn
- Huiduitslag
- Gewrichtspijn
- Obstipatie of diarree
- Reactie op aanprikplaats
- Smaakstoornis (ijzersmaak)

Ferinject heeft geen invloed op de rijvaardigheid.

**Vragen?**

Wij hopen dat wij al uw vragen beantwoord hebben en dat eventuele onzekerheden weggenomen zijn door het lezen van deze folder en/of het gesprek met de specialist. Als u toch nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek van uw medisch specialist.