

Wat is een stereotactische biopsie?

Bij een biopsie wordt een stukje weefsel uit het lichaam gehaald om onderzocht te worden. Een stereotactische biopsie is een biopsie van een afwijking in de borst, waarbij gebruik wordt gemaakt van röntgenbeelden. Daardoor is een precieze plaatsbepaling van de afwijking mogelijk.

Het onderzoek

U gaat met ontbloot bovenlichaam op uw buik op de onderzoekstafel liggen. Uw borst hangt door een opening in de onderzoekstafel omlaag. De borst wordt samengedrukt en vanuit verschillende invalshoeken worden röntgenfoto's gemaakt. Aan de hand daarvan bepaalt de radioloog met behulp van de computer de beste plaats(en) om biopten te nemen.

Op de plaats waar de punctie zal worden gedaan, wordt de huid verdoofd en gedesinfecteerd. Via een klein sneetje in de huid wordt een aantal biopten genomen met een speciale naald. Deze biopten gaan naar het pathologisch laboratorium voor cel- en weefselonderzoek. Het sneetje in uw borst wordt met hechtpleistertjes (Steristrips) verbonden.

De uitslag

De uitslag van de biopten is na 7 tot 10 werkdagen bekend. Uw arts zal de uitslag bij uw eerstvolgende afspraak met u bespreken.

Is röntgenstraling gevaarlijk voor u?

De hoeveelheid röntgenstraling die gebruikt wordt voor de röntgenfoto's is zo klein, dat er geen schadelijke effecten kunnen optreden.

Röntgenonderzoek en zwangerschap

De blootstelling voor een ongeboren kind (vooral in de eerste 20 weken) aan straling is niet zonder gevaar. Informeer dus altijd uw arts als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent, zodat de risico's van de straling voor de ongeboren vrucht afgewogen kunnen worden tegen de noodzaak van het röntgenonderzoek.

Medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen slikt, zal uw arts u instructies geven of en per wanneer u moet stoppen met het gebruik hiervan.

Vorbereiding

- Draag losse, comfortabele kleren
- Draag een stevige bh of neem er een mee, voor steun van de borst na het onderzoek
- Dit helpt onderhuidse nabloeding tegen te gaan
- Geen bodylotion of talkpoeder op de borsten of aluminiumhoudende deodorant onder de oksels

Bijwerkingen

Soms treedt een onderhuidse nabloeding op. Dit ziet eruit als een blauwe plek, die na verloop van weken weer wegtrekt.

Nazorg

- Draag een stevige bh na het onderzoek, om onderhuids nabloeden te helpen tegengaan.
- De hechtpleisters (Steristrips) moeten 3 tot 4 dagen blijven zitten. U kunt ermee douchen.
- U mag niet baden of zwemmen tot een week na het onderzoek. Dit vanwege infectiegevaar.
- Bij napijn of pijn door een bloeding kunt u een paracetamol innemen.

Vragen?

Belt u dan tijdens kantooruren met de afdeling radiologie op telefoonnummer 075 650 1310.

De mammacare verpleegkundige is bereikbaar op het nummer: 075 650 7445