

U bent opgenomen geweest en tijdens de opname is een JJ splint in de urineleider geplaatst. De urineleider loopt van de nier naar de blaas. De JJ splint ligt met een krul in de nier en met het uiteinde met een krul in de blaas.

Klachten die een JJ splint kan veroorzaken

- De urine kan wat bloederig zijn.
- Als de splint is geplaatst vanwege nierstenen, is het mogelijk dat u nog een steen of steentjes uitplast. Dit gaat soms gepaard met schrijnende pijn.
- Tijdens het plassen kunt u een druk in de nier ervaren, doordat via de splint urine in de nier terugstroomt.
- U kunt wat vaker moeten plassen en vaak ervaart men een zeurend/drukkend gevoel in de onderbuik.
- Voldoende vochtinname is belangrijk, 1,5 tot 2 liter per dag! Dit draagt namelijk bij tot een goed herstel.

Recept

U heeft mogelijk een recept Oxybutinine tot 3 dd 5 mg meegekregen. Dit is een medicijn dat de blaas rustiger maakt. Deze kunt u zo nodig gebruiken. Dit medicijn kan als bijwerking hebben: een droge mond en obstipatie.

Wanneer neemt u contact op?

Als zich één van de volgende verschijnselen voordoet, is het raadzaam contact op te nemen:

- Als u koorts boven de 38.5 °C krijgt.
- Als u klachten heeft die niet verminderen/verdwijnen na het innemen van de medicatie.

Controle

Bij uw ontslag heeft u een afspraak meegekregen voor controle op de polikliniek Urologie. De JJ splint kan tot maximaal 3 maanden blijven zitten.

Bij problemen of vragen na uw ontslag

Na ontslag van de verpleegafdeling verzoeken wij u, bij problemen, contact op te nemen met de polikliniek Urologie. Zij zijn bereikbaar via het Klantcontactcentrum op nummer **075 650 1290** (ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uur)

Na 17.00 uur kunt u contact opnemen met de Spoed Eisende Hulp: **075 650 2600**